

BỆNH LAO Ở TRẺ EM

CÁCH PHÒNG BỆNH LAO

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH
BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI BÌNH ĐỊNH

BỆNH LAO VÀ HIV/AIDS

- Trẻ em cũng mắc lao như người lớn.
 - Trẻ em rất dễ mắc bệnh lao khi tiếp xúc với người bệnh lao. Trẻ nhỏ càng dễ mắc bệnh.
- Hãy đưa trẻ đi khám phát hiện bệnh lao khi có các yếu tố sau:
- Trẻ sống cùng nhà với người bệnh lao.
 - Trẻ có dấu hiệu ho, thở khò khè hoặc có sốt kéo dài hơn 2 tuần, sụt cân, ra mồ hôi đêm.



- Tiêm phòng lao cho trẻ sơ sinh hoặc khi trẻ còn dưới 1 tuổi.
- Phát hiện sớm người mắc bệnh lao và chữa cho khỏi bệnh.
- Người bệnh lao cần che miệng khi ho, không khạc nhổ đờm bừa bãi, nên khạc đờm vào mảnh giấy hoặc cốc giấy rồi đốt đi.
- Đưa trẻ em dưới 5 tuổi sống trong gia đình có người mắc bệnh lao phổi đến trạm y tế để được tư vấn dự phòng lao.
- Giữ vệ sinh môi trường sống và nâng cao sức khỏe.



- Người có HIV rất dễ mắc bệnh lao. Hơn 30% người có HIV có thể mắc lao và một nửa trong số đó có thể chết do lao nếu không được điều trị.

- Người có HIV khi có bất kỳ một dấu hiệu nào sau đây: Ho, khạc đờm, sốt, sụt cân, ra mồ hôi đêm.... cần phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám phát hiện bệnh lao.

- Có thể chữa khỏi bệnh lao cho người có HIV nếu phát hiện sớm và chữa đúng cách.

- Ngược lại, người bệnh lao cần xét nghiệm máu để phát hiện HIV.

PHÒNG BỆNH LAO CHỮA BỆNH LAO KẾT THÚC BỆNH LAO



VÌ SỨC KHỎE CỦA MÌNH
TẤT CẢ NGƯỜI BỆNH LAO HÃY XÉT NGHIỆM MÁU ĐỂ PHÁT HIỆN HIV

PHÒNG XÉT NGHIỆM

Chương trình chống lao Quốc gia